

## As vacinações são todas iguais?

Não. Segurança, proteção, número de doses e conforto de cada vacinação variam conforme a origem da vacina, o processo de desenvolvimento e de produção do laboratório, a cadeia de frio. Variam, ademais, com a indicação e orientações apropriadas, a habilidade do vacinador, a organização e higiene do serviço de vacinação.

No quadro seguinte são apresentadas as vacinações recomendadas pelo Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Imunizações e Associação Brasileira de Pediatria, considerando particularidades da vacinação oferecida no Posto de Saúde e na Climep.

Vacinações	Posto de Saúde	Climep
BCG intradérmica	A perfeita aplicação intradérmica é fundamental para evitar complicações (abscesso, cicatrizes pronunciadas).	
Hepatite B	Disponível a partir do nascimento em algumas maternidades	Disponível em qualquer maternidade ou domicílio mediante convocação do <u>Vacine em Casa</u> da Climep devidamente licenciado pela SESMA. Disponível combinada na vacina HEXA acelular (mais conforto e segurança).
Rotavírus	Vacinação <u>monovalente</u> . As duas doses da vacinação devem administradas até cinco meses e meio.	Vacinação <u>pentavalente</u> . As três doses da vacinação podem ser administradas até oito meses de idade. Mais segura com proteção mais abrangente.
Difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, pólio, hepatite B	Por causa da fração pertussis de células inteiras até 90% mais reações que a vacinação acelular, mais moderna. Vacina oral para pólio relacionada a raros casos de paralisia infantil	<u>Maior conforto</u> : todas as vacinas combinadas numa mesma injeção (HEXA, PENTA, ou TETRA com Vip). <u>Mais segurança</u> : até 90% menos eventos adversos; ausência de risco de paralisia infantil relacionada à vacinação.
Pneumocócicas conjugadas	Recomendada para crianças de até 2 anos de idade. Combinação de 10 valências (PN10), menos imunogênica, exceto para um sorotipo.	Recomendada para crianças de até 6 anos de idade, ou <i>off label</i> em qualquer idade. Combinação de 13 valências (PN13), mais imunogênica, muito segura, experiência de mais de 10 anos. Constitui-se a <u>vacinação mais abrangente</u> reduzindo em 90% o risco de infecção pneumocócica.
Pneumocócicas polissacarídicas	Disponível no CRIE para pacientes de risco de complicações pela infecção pneumocócica. Não é oferecida rotineiramente.	Recomendada a partir do segundo ano de vida para indivíduos com doenças crônicas preferencialmente após vacinação PN13.
Meningocócicas conjugadas	Vacinação MONOVALENTE C entre 3m e 4ª de vida. Adolescentes até 19 anos.	Vacinação MONOVALENTE B (disponível a partir dos 2 meses) e QUADRIVALENTE ACYW <sup>135</sup> recomendada para pessoas de todas as idades. A vacinação meningocócica ACYW <sup>135</sup> substitui a meningocócica C nos EUA e Europa a partir dos dois meses de idade.
Influenza	Oferecida para idosos em campanha no final do mês de abril de cada ano. Disponível para crianças entre 6 e 23m de idade, profissionais de saúde e pacientes sob risco maior de complicações relacionadas à infecção pelo vírus da gripe. Idosos acima dos 50 anos ou mais.	Oferecida para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade através de uma nova Formulação quadrivalente a cada ano, conforme é recomendado desde 2010 nos EUA, Canadá e vários outros países.
Febre amarela	Vacina brasileira da FIOCRUZ	Vacina francesa da Sanofi Pasteur
Sarampo, rubéola, caxumba e varicela	Vacinação TRIVIRAL (sarampo, rubéola e caxumba)	Vacinação TRIVIRAL e TETRAVIRAL (sarampo, rubéola, caxumba e varicela)
Varicela (catapora)	Disponível na vacina tetraviral (dose única) aos 15m até 5ª.	Oferecida isolada ou em combinação na TETRAVIRAL
Hepatite A	Disponível para crianças em dose única aos 15m até 5 anos.	Oferecida isolada (HA) ou combinada à vacina contra a hepatite B (HA e B)
Herpes-Zoster	Não disponível	Disponível para pessoas a partir dos 50 anos, que já tiveram catapora na infância
HPV	Não disponível	BIVALENTE são recomendadas. A primeira para indivíduos de ambos os sexos entre nove e 45 anos de idade, e a segunda para mulheres entre 9 e 45 anos de idade.
Dengue	Não disponível	Disponível para pessoas a partir dos 9 anos que já tiveram contato com o vírus.